

## Silverförband

**Författat av:** Pia Backteman, Helena Pellrud  
**Berett av:** Kompetensgrupp Sår, Lars Berggren  
**Beslutat av:** Ylva Nilsagård

### Innehållsförteckning

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Inledning/syfte .....</b>  | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Omfattning/tillämpningsområde .....</b>  | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Ansvar .....</b>   | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Giltighetstid.....</b>   | <b>1</b> |
| <b>5</b> | <b>Rekommendation för användning av silverförband inom Region Örebro län.....</b> | <b>1</b> |
| <b>6</b> | <b>Referenser.....</b>  | <b>2</b> |
| <b>7</b> | <b>Nyckelord .....</b>  | <b>2</b> |

#### **1 Inledning/syfte**

Syftet med denna riktlinje är att förband som innehåller silver ska användas på rätt sätt.

#### **2 Omfattning/tillämpningsområde**

Gäller hela Hälsa och sjukvårdsförvaltningen samt privata vårdcentraler

#### **3 Ansvar**

Kompetensgrupp Sår

#### **4 Giltighetstid**

Giltigt till och med 20220630

#### **5 Rekommendation för användning av silverförband inom Region Örebro län**

Det evidensbaserade underlaget för användning av silverförband vid långsamläkande sår är begränsat. Ett visst stöd för kortsiktigt förbättrad sårhäkning jämfört med rutinmässig behandling *kan* finnas. Användning av silverförband bör endast ske inom ramen för kontrollerade studier eller annan systematisk uppföljning. Silverförband kan provas på misstänkt infekterade / kritiskt koloniserade sår

där per oral antibiotika ej anses indicerad. Detta bör ske på ordination av läkare och maximal behandlingstid är 3 veckor. Noggrann uppföljning / utvärdering krävs.

## 6 Referenser

[Rapport från CAMTÖ – Silverförband vid behandling av kroniska besår](#)

## 7 Nyckelord

Silver, silverförband, sår, sårbehandling, omvårdnad sår,

