

Här kommer årets första veckas viktiga från arbetsgruppen förstärkt samverkan med ett meddelande från Smittskydd & Vårdhygien.

Därför gäller fortsättningsvis samma rutiner oavsett vaccinationsstatus

Vaccinering av vårdtagare på länets äldreboenden är nu i stort sett avklarad. De allra flesta vårdtagare har fått två vaccindoser.

Utbrott bland vaccinerade

Vi har den senaste veckan trots detta fått information om ett utbrott av covid-19 på ett äldreboende. Sammanfattningsvis har hittills tre vårdtagare, som fått två doser vaccin, insjuknat med svåra symtom. Ytterligare tre färdigvaccinerade vårdtagare har PCR-testats positiva i samband med screening. Hittills har dessa tre inte utvecklat symtom. Två vårdtagare, som endast hunnit få en vaccinationsdos, är också positiva i PCR-test men är hittills utan symtom. Flera i personalgruppen har också insjuknat. Ingen personal var vaccinerad, förutom en som fick covid-symtom cirka en vecka efter första vaccindosen.

Olika skyddseffekt av vacciner

Äldre personer har generellt sämre skyddseffekt av vacciner, tex influensavaccin, och det förväntas gälla även för vaccin mot covid-19. De flesta äldre som är vaccinerade kommer förhoppningsvis inte att drabbas av svår sjukdom, men kan ha lindriga symtom och även vara asymtomatiska bärare.

Vaccination av personal som vårdar äldre och sjuka personer är ytterst viktig, eftersom personalen har ett bättre immunsvaret och därför svarar bättre på vaccinet. Detta kan förhindra smittspridning till de sköra vårdtagarna.

Hög misstänksamhet vid symtom, stanna hemma och följ rutiner

Det är viktigt att även fortsättningsvis ha en hög misstänksamhet avseende covid-symtom hos äldre, även om de är vaccinerade, och att vara frikostig med provtagning för covid-19.

Personal inom vård och omsorg som är vaccinerade mot covid-19 ska vid nytillkomna symtom, precis som tidigare, stanna hemma och ta prov för covid-19. Personal som haft covid-19-infektion det senaste halvåret räknas som immuna och behöver inte ta nytt covid-19-prov, men ska stanna hemma tills symtomförbättring skett (för att inte sprida andra virus på jobbet).

Samma rutiner som tidigare gäller också angående användning av skyddsutrustning, att om möjligt hålla avstånd samt att alltid följa de basala hygienrutinerna.