

HPV vaccination på vårdcentral

Bakgrund

Gardasil 9 är vaccin mot humant papillomvirus (HPV) för prevention av höggradig cervixdysplasi och cervixcancer. Gardasil 9 skyddar också mot genitala vårtor, condyloma acuminata (spetsvårtor). Från 2010 ingår vaccination med HPV-vaccin i det allmänna programmet för flickor födda 1999 och sen

Från 2020 ingår även vaccination av pojkar födda 2009 och senare are.

I samband med screening mot livmoderhalscancer har alla kvinnor födda 1994-1999 rätt till avgiftsfri HPV-vaccination. [Sverige på god väg att utrota livmoderhalscancer - RCC \(cancercentrum.se\)](https://www.cancercentrum.se/utrota-livmoderhalscancer)

- De som inte har blivit vaccinerad i skolan, men som senare vill vaccinera sig, kan kontakta sin vårdcentral för vaccination.
- Den som vaccinerar sig på vårdcentral får betala en avgift på 600 kronor per dos.
- 2 dos schema from 18 års ålder (regionalt beslut) 0 , 6 månader.
- 3 dos schema 15-17 års ålder samt koniserad. 0 2 6 månader

Rutin för HPV-vaccination på vårdcentral

1. Patient hör av sig till vårdcentralen med önskan om att vaccinera sig mot HPV
2. Distriktssköterska kontrollerar med patienten att inga kontraindikationer föreligger
Fyller i Mitt vaccin ”Allmän Hälsodeklaration” samt lägger ett administrativt ärende till läkare som ordinerar
3. Läkare ordinerar vaccination
 - Gardasil 9 två-dosschema 9-14 år samt ≥ 18 år HPV vaccination i.m 0,6 mån
 - Gardasil 9 tre-dosschema 15 -17 år + koniserad HPV vaccination i.m 0,2,6 mån
4. Sjuksköterska tillser att vaccinet finns hemma på vårdcentralen annars rekvireras vaccinet.
5. Besök bokas som distriktssköterskebesök. Patienten betalar 600 kr i kassan per dos.
6. Distriktssköterska ger vaccinationen
7. . Ny besökstid för injektion 2 bokas in i samband med första besöket. Samma rutiner gäller för besök för en eventuell 3:e injektion.



Vaccin: Gardasil 9 förfylld spruta.

Dosering

- Det är barnets ålder vid första dosen som avgör om det är två- eller tre-dosschema som
- Vid vaccination enligt två-dosschema bör intervallet mellan doserna vara minst 6 månader. Doserna ges helst inom ett år, men vid längre intervall behöver inte vaccinationsserien startas om.
- I ett tre-dosschema rekommenderas att de två första doserna ges med 2 månaders mellanrum. Intervallet mellan dos två och tre bör vara minst 4 månader. Alla tre doser bör helst ges inom ett år, men vid längre intervall behöver inte vaccinationsserien börjas om eller extra doser ges.

Administreringsätt

Vaccinet ska administreras genom intramuskulär injektion. Vaccinet ges företrädesvis i överarmens deltoidmuskel eller i lårets anterolaterala del.

Gardasil 9 får inte injiceras intravaskulärt, subkutant eller intradermalt. Vaccinet får inte blandas i samma spruta med andra vacciner eller lösningar.