

Hantering av perorala läkemedel med risk för bestående toxisk effekt, arbetsinstruktion - Bilaga 3

Tabletter, kapslar, mixturer, pulver, granulat

Vid hantering av hela tabletter och kapslar föreligger ytterst små risker. Undvik att dela eller krossa tabletter och kapslar på grund av risk för partikelspridning.

Om patienten inte kan svälja en hel tabl/kaps bör beredningsform omprövas. Saknas alternativ beredningsform kan i vissa fall tabletter lösas upp i vatten, delas eller krossas och kapslar delas.

Alla tabletter och kapslar kan inte delas eller krossas på grund av förändrad effekt eller risk för biverkningar i munhåla och svalg. På [FASS](#) finns delbarhetsinformation för många läkemedel. I krossningsdatabasen, [Stöd vid läkemedelshantering](#), finns information om krossning av läkemedel före administrering oralt eller i enteral sond.

Antibiotikamixturer ska beredas på sjukhusapoteket.

| | |
|-----------------------------|---|
| Exempel på läkemedel | antibiotika (penicilliner, sulfametoxazol), neuroleptika (levomepromazin), glukokortikoider (betametason), antihistaminer av fentiazintyp (alimemazin, prometiazin), bulkmedel med ispaghula |
| Risker | <ul style="list-style-type: none"> Partikelspridning vid delning och krossning av tabletter och kapslar samt vid hantering av pulver och granulat Spill vid hantering av mixturer |
| Skyddsutrustning | <ul style="list-style-type: none"> Skyddshandskar i nitril och munskydd klass II vid krossning Plastat underlägg för att fånga eventuellt spill på bänk |
| Arbetssätt | <ol style="list-style-type: none"> Handdesinfektion Sätt på skyddsutrustning enligt ovan och arbeta på det plastade underlägget Vid behov av att krossa eller dela en tablett eller öppna en kapsel kontrollera att det är möjligt, se information ovan Tablettdelare bör användas för att få en god doseringsnoggrannhet, när halva tabletter ordinerats. Vid behov av att krossa, ska det ske med hjälp av en tablettkross för att minska dammrisk. Blanda omedelbart den krossade tablett med ca 20 ml vatten/annan vätska alt. kräm eller dyl Diska tablettdelare/tablettkross genom att först torka ur läkemedelsrester med fuktigt papper (gör detta moment på plastat underlägg). Skölj med rikligt med vatten i handfatet, låt torka |
| Åtgärder vid spill | <ul style="list-style-type: none"> Spill på arbetsbänk torkas upp omgående. Avlägsna spill med absorberande torkduk, rengör med vatten (avlägsnar spill bättre) och därefter med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande verkan/tensid Vid hudkontakt, tag av förorenade kläder och tvätta med tvål och vatten Vid ögonkontakt, skölj med stora mängder vatten eller koksaltlösning (15 min) Vid inandning, andas in frisk luft |
| Avfall | Skyddshandskar, plastat underlägg, munskydd och eventuellt övrigt avfall kastas i gul uppsamlingsbox för riskavfall |