

Handläggning IVA patienter, vårdhygienisk riktlinje

IVA- riktlinjer vid misstänkt eller konstaterad MRB/ luftburen smitta/gastroenterit

Nödvändig medicinsk behandling får inte försenas på grund av misstänkt eller konstaterad förekomst av MRB/luftburen smitta.

Vid vård av patient med misstänkt/konstaterad MRB (multi resistent bakterier) eller luftburen smitta behöver basala hygienrutiner i vissa fall kompletteras med vård på enkelrum, eller enkelrum med luftsluss. Vid utbrott eller stor risk för utbrott av MRB kan kohortvård med särskilt avdelad personal behövas.

Spridning av MRB i vårdmiljöer gynnas av bristande följsamhet till vårdhygieniska rutiner. I vårdmiljöer med överbeläggning eller otillräckliga ytor kring vård- och behandlingsplatser riskeras också spridning av MRB. Vid sen upptäckt av smittbärare ökar risken för spridning.

Förutom odlings svar behöver man ta hänsyn till patientens eventuella riskfaktorer* för spridning i miljön, och göra individuella bedömningar.

Förslag på vårdplats

Enkelrum med luftsluss

- Vattenkoppor, mässling, smittsam tuberkulos, stora bränn/sårskador (pga. ökad mängd hudflagor)

Enkelrum med stängd dörr

- Misstänkt eller konstaterad MRB med riskfaktorer*
- Gastroenterit (diarré och/eller kräkning)
- Luftvägsinfektion (i förstahand influensa, RS-virus, SARS-CoV-2)

Samvård/tvåsal

- Misstänkt eller konstaterad MRB utan riskfaktorer i samråd med Vårdhygien

Övrigt

- Informera städ- och service personal samt konsulter
- Kontakta Vårdhygien för fortsatt handläggning

* MRSA-utbredda hudlesioner

* VRE/ESBL-diarré