Hepatit B - postpartumprofylax till nyfödda

Nyfödda barn till HBsAg-pos mödrar

Barn till mödrar med hepatit B-smitta bör få första dosen av monovalent hepatit B-vaccin snarast efter födseln. Barn till mödrar med hög smittsamhet (ffa HBeAg-positiva) ges både vaccin och immunglobulin mot hepatit B, snarast efter födseln.

Handläggning

Barnet vaccineras efter ordination i MittVaccin av barnläkare snarast efter födelsen av barnmorska på förlossningen. Dokumenteras på FV2.

Vid barnläkarundersökning på BB skall barnläkare ombesörja att barnet kallas vid 18 månaders ålder för provtagning med anti-HBs-ak (utvärdera vaccineffekt) och med HBsAg och anti-HBc-ak (påvisa aktiv eller genomgången infektion).

På FV2 skriver barnläkaren att barnet ska vaccineras med monovalent HB-vaccin på BVC vid 1 mån ålder (dos 2) och därefter enligt ordinarie schema.

Att amma sitt barn möter inget hinder ur smittosynpunkt.

Uppföljning BVC

Fortsatt vaccination mot Hepatit B enligt schema:

- en dos vid 4 veckor med Engerix-B 10 µg/0,5 ml i m (obs! får ej senareläggas!)
- en dos 6-valent DTP-Polio-Hib-HB vid 3, 5 och 12 mån (ordinarie schema).
- BHV-sjuksköterska ordinerar vaccinationerna inklusive dos 2.

Länkar:
Vårdrutiner för nyfödda på förlossning/BB/eftervård – gemensamt för vårdkedjan i RÖL
Rekommendationer om vaccination mot hepatit B – Profylax med vaccin och immunglobulin – före och efter exposition

Granskat av: Charlotte Lybeck Överläkare Infektionskliniken,
John Ryberg Barnhälsovårdsöverläkare,
Kadir Shilan överläkare Obsterik och gynekologi,
Simon Jarrick överläkare Barn- och ungdomsmedicin.