

Smittfriförklaring vid tarmsmitta, kontrollprov

Personer med gastroenteritsymtom (diarré eller kräkning) ska sjukskrivas.

Symtomfria personer kan, om de kan tillgodogöra sig hygieninformation, återgå till arbete eller skola. Riskyrke och förskolebarn se tabell nedan. Riskyrke = a) personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel. b) personer som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med nedsatt immunförsvar.

Symtomfria personer med riskyrke omplaceras om möjligt i väntan på negativa kontrollprov, i annat fall avstängs personen och har då rätt till smittbärappenning.

Kontrollprov innan återgång till arbete, skola, förskola

	Normalfall	Riskyrke	Förskolebarn
Amöba ¹	0 kontrollprov	0 kontrollprov	0 kontrollprov
Campylobacter ¹	0 kontrollprov	0 kontrollprov	0 kontrollprov
Cryptosporidium ¹	0 kontrollprov	0 kontrollprov	0 kontrollprov
Giardia ¹	0 kontrollprov	0 kontrollprov	0 kontrollprov
EHEC ¹	0 kontrollprov	Enbart stx1 utan HUS – 0 kontrollprov Med stx2 eller HUS – 1 negativt kontrollprov	Enbart stx1 utan HUS – 0 kontrollprov Med stx2 eller HUS – 1 negativt kontrollprov
Salmonella ¹	0 kontrollprov	1 negativt kontrollprov	0 kontrollprov. Återgå när stabilt symtomfri.
Shigella ¹	0 kontrollprov	Antibiotikabehandlad – 1 negativt kontrollprov ² Ej antibiotikabehandlad – 3 negativa kontrollprov ³	Antibiotikabehandlad – 1 negativt kontrollprov ² Ej antibiotikabehandlad – 3 negativa kontrollprov ³
Typhi/paratyphi ¹	0 kontrollprov	3 negativa kontrollprov ^{2,3}	3 negativa kontrollprov ^{2,3}
Yersinia ¹	0 kontrollprov	0 kontrollprov	0 kontrollprov

¹ Person som arbetar med oförpackade livsmedel är enligt europeisk livsmedelslagstiftning skyldig att meddela sin arbetsledare om smittan (EG-förordningen 853/2004, bilaga II, kap VIII, punkt 2).

² Provtagning påbörjas tidigast en vecka efter avslutad antibiotikabehandling.

³ Högst ett prov per dag.

För mer information se respektive [smittskyddsblad](#)