Symtom/Diagnos där ambulanstransport skall ske även om patient är opåverkad.

Tillstånd där patient kan vara opåverkad på vårdcentralen men ska skickas med ambulans till sjukhus.

Se dokument för Akut kranskärlssjukdom.

✓ **Akut kranskärlssjukdom**

- Hjärtinfarkt
- Vid kliniskt sannolik instabil angina pectoris
  (vid oklarhet efter samråd/överenskommelse med kardiolog)

✓ **AV-block III**

✓ **Stroke/TIA eller uppgifter om TIA inom 6 senaste dygnen**

✓ **Vid kliniskt sannolik lungemboli**

- Sätt i.v. infart, dokumentera vitalparametrar, medvetandegrad/RLS 85 (se bilaga 1)
  - Fyll i Transportordination (indikation för ambulanstransport) och bevaka patient i väntan på ambulans.

- Skriv ut *remissen* till ambulanspersonal som journalhandling.

Nyckelord

Akut kranskärlsjukdom, hjärtinfarkt, angina, bröstsmärta, ischemisk bröstsmärta, kärlkramp, lungemboli, AV-block, stroke, TIA, hjärnblödning

Bilaga 1

	RLS 85 (reaction level scale)
1	Vaken. Orienterad, ingen svarslatens.
2	Slö/oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering (tilltal, beröring).
3	Mycket slö/oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering.
4	Medvetslös. Lokaliserar smärta utan att avvärja.
5	Medvetslös. Undandragande rörelser vid smärtstimuli.
6	Medvetslös. Stereotypa böjrörelser vid smärtstimuli.
7	Medvetslös. Stereotypa sträckrörelser vid smärtstimuli.
8	Medvetslös. Ingen smärtreaktion.