

Symtom/Diagnos där ambulanstransport skall ske även om patient är opåverkad.

Tillstånd där patient kan vara opåverkad på vårdcentralen men ska skickas med ambulans till sjukhus.

Se dokument för [Akut kranskärlssjukdom](#).

✓ Akut kranskärlssjukdom

- Hjärtinfarkt
- Misstänkt instabil angina pectoris
(vid oklarhet efter samråd/överenskommelse med kardiolog)

✓ AV-block III

✓ Stroke/TIA eller uppgifter om TIA inom 6 senaste dygnet

✓ Vid kliniskt sannolik lungemboli

- Sätt i.v. infart, dokumentera vitalparametrar, medvetandegrad/RLS 85 (se bilaga 1)
- Fyll i [Transportordination](#) (indikation för ambulanstransport) och bevaka patient i väntan på ambulans.
- Skriv ut *RoS Konsultremiss* till ambulanspersonal som journalhandling.

Nyckelord

Akut kranskärlsjukdom, hjärtinfarkt, angina, bröstsmärta, ischemisk bröstsmärta, kärlkramp, lungemboli, AV-block, stroke, TIA, hjärnblödning

Bilaga 1

	RLS 85 (reaction level scale)
1	Vaken. Orienterad, ingen svarslatens.
2	Slö/oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering (tilltal, beröring).
3	Mycket slö/oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering.
4	Medvetlös. Lokaliserar smärta utan att avvärja.
5	Medvetlös. Undandragande rörelser vid smärtstimuli.
6	Medvetlös. Stereotypa böjrörelser vid smärtstimuli.
7	Medvetlös. Stereotypa sträckrörelser vid smärtstimuli.
8	Medvetlös. Ingen smärtreaktion.