


## Tuberkulos, smittspårning – Indexpatientens behandlande läkare är ansvarig för smittspårningen



TB i övriga organ vanligen inte smittsam men ändå viktigt med smittspårning för att upptäcka smittkälla och andra personer som exponerats för smittkällan

### Definition Positiv IGRA

Gränsen för positivt test är  $\geq 0,35$  IU/mL  
Resultat nära denna gräns (0,20-0,99 IU/mL) ska tolkas med försiktighet och bör kontrolleras om.

### Definition Positiv TST

Barn <5 år, Immunsupprimerad  $\geq 6$  mm  
Vuxna, Barn  $\geq 5$  år  $\geq 10$  mm

**Tuberkulinomslag**  
Ökning med  $\geq 6$  mm för barn och immunsupp.  
och  $\geq 10$  mm för övriga

### Definition kontakter

**Närkontakter** – Personer med nära och långvarig kontakt med den sjuke, huvudsakligen familjemedlemmar och hushållskontakter

**Mindre nära kontakter** – Vänner, skolkamrater\*, arbetskamrater\*, lekkamrater och sjukvårdspersonal som har upprepade, men mer sporadiska kontakter med den sjuke.

\* kan ibland räknas som nära kontakter

### Hur länge har index varit smittsam

Beror på symtom och utbredning

- Högsmittsam index – upp till 3 månad innan diagnos.
- Lågsmittsam index – upp till 1 månad innan diagnos.