Region Örebro län
Smittskyddsenheten

Förvaltning		Dokumentrubrik Tuberkulos, smittspårning	Dokumentnr Revision 446808 R4
		Ägare Angelika Skeppstedt	Reviderat datum 2024-02-12
Verksamhet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,Privata vårdcentraler		Slutgranskare Angelika Skeppstedt	
Diarienr	Dokumentkategori Riktlinjer	Fastställare Gunlög Rasmussen	Giltigt datum fr o m 2024-02-15

Tuberkulos, smittspårning – *Indexpatientens behandlande läkare är ansvarig för smittspårningen*

Flödesschema vid hög smittsamhet, exponerad för smitta

Mikroskopipositiv TB i lunga och/eller struphuvud, kavern på lungrtg (även om mikro neg)



Flödesschema vid låg smittsamhet, exponerad för smitta

Odlingsverifierad och/eller PCR-positiv men neg mikroskopi



TB i övriga organ vanligen inte smittsam men ändå viktigt med smittspårning för att upptäcka smittkälla och andra personer som exponerats för smittkällan

Definition Positiv IGRA

Gränsen för positivt test är ≥0,35 IU/mL

Resultat nära denna gräns (0,20-0,99 IU/mL) ska tolkas med försiktighet och bör kontrolleras om.

Definition Positiv TST

Barn <5 år, Immunsupprimerad	≥ 6 mm
Vuxna, Barn ≥5 år	≥ 10 mm

Tuberkulinomslag

Ökning med ≥ 6 mm för barn och immunsupp. och ≥ 10 mm för övriga

Definition kontakter

Närkontakter – Personer med nära och långvarig kontakt med den sjuke, huvudsakligen familjemedlemmar och hushållskontakter

Mindre nära kontakter – Vänner, skolkamrater*, arbetskamrater*, lekkamrater och sjukvårdspersonal som har upprepade, men mer sporadiska kontakter med den sjuke.

** kan ibland räknas som nära kontakter*

Hur länge har index varit smittsam

Beror på symtom och utbredning

- Högsmittsam index – upp till 3 månad innan diagnos.
- Lågsmittsam index – upp till 1 månad innan diagnos.