

## Virusorsakad gastroenterit provtagningsanvisning, vårdhygienisk riktlinje

### Ta prover från 2-3 akut sjuka vårdtagare för diagnos av utbrottet.

Prov tas för gastroenteritvirus. För att utesluta andra orsaker till vårdtagarens symtom kan prov för *Clostridoides difficile* och övriga tarmpatogener tas. Vid provtagning analyseras även andra gastroenteritvirus än calici. Oavsett vilket av dessa virus som orsakar sjukdom ska patienten vårdas efter symtom och kohortvård ska bedrivas tills 48 h efter symtomfrihet.

Faeces är rekommenderat provmaterial. Norovirus kan även påvisas i kräkning, men det är vanligen ett sämre provmaterial på grund av lägre virusmängder. Burk med sked och skruvlock måste användas, pinnprov går inte att analysera.

Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Transporttiden skall hållas så kort som möjligt. Proverna lämnas till Mikrobiologen, USÖ. Endast prov för gastroenteritvirus kan lämnas till provmottagningen, M-huset, USÖ.

Prov för gastroenteritvirus analyseras och besvaras inom 0-2 vardagar. Toxinanalys för *Clostridoides difficile* utförs vanligen inom 1 vardag. Toxinnegativt prov slutsvaras direkt. På toxinpositivt prov lämnas preliminär svar och när den kompletterande odlingen är klar slutbesvaras provet. Prov för övriga tarmpatogener besvaras vanligen inom 2-3 vardagar.

### E-remiss används i första hand. I kommunal vård används pappersremiss, se nedan.

**1) En burk med sked o skruvlock, 1 ml faeces, för gastroenteritvirus**

Remiss: Mikrobiologi/immunologi utom odling, *Gastroenteritvirus*



**2) En burk med sked o skruvlock, 1 ml faeces, för *Clostridoides difficile***

Remiss: Odling, *Faeces, C.difficile*



**3) Ett pinnprov för tarmpatogener, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobakter**

Remiss: Odling, *Faeces, odling*



[Remisser för utskrift](#)