



Remiss autolog blodgivning

Remitterande enhet:		Personnr:
Kopia/akutsvar sänds till:		Namn:
<input type="checkbox"/> Öppenvård	<input type="checkbox"/> Inneliggande	Adress:
Remissdatum		Telefon:
Remitterande läkare:		Patient data:
Namn:		Hb _____ g/L
Adress:		Vikt _____ kg
Remiss till:		Smittscreen utfört (HBV, HCV, HIV, HTLV, Lues) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aferesmottagningen, USÖ	Tel. 019-6022639	Jehovas vittne: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<input type="checkbox"/> GeBlod, Karlskoga lasarett	Tel. 0586 - 66292	
Indikation för autolog blodgivning		Infrysning för eget behov (frystblod)
Inför planerad operation		<input type="checkbox"/> Sällsynt blodgrupp: _____ - negativ
Diagnos/planerat ingrepp:		<input type="checkbox"/> Immuniserad med multipla erytrocytantikropp(ar)
Operationsdatum:		anti - _____ - _____ - _____ - _____
Inlägges avdelning:		
Önskat antal blodenheter <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> _____		
Järntabletter 100 mg 1 x 2 är ordinerade <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Information till remitterande klinik		
Autolog blodgivning (egenblodgivning) kan göras inför planerade operationer. För immuniserad gravid med multipla erytrocytantikroppar tas kontakt med blodcentralen i god tid före förlossning.		
Patientens hälsa ska tillåta avtappning av 450 mL blod det önskade antalet gånger utan risk. Blodvolymen är relaterad till kroppsvikten. För patienter med kroppsvikt < 50 kg och/eller yngre än 18 år eller över 70 år bör en samlad bedömning göras utifrån Hb, vikt, ålder och antalet planerade autologa enheter (en mindre tappningsvolym kan då bli aktuell).		
Kontraindikationer:		
Aktiv systemisk bakterieinfektion, svår hjärt- eller lungsjukdom (t.ex. ventrikulär arytmi, aortastenosis, instabil angina, hjärtsvikt), blödersjukdom, aktiv infektion med HBV, infektion med HCV, infektion med HIV1/2, infektion med HTLV 1/2, hypertoni (> 180/100), hypotoni, aktiv epilepsi, Hb < 100 - 110 g/L. .		
Väl ifylld remiss skickas i god tid före planerad operation. Ange antal önskade blodenheter. Autolog blodgivning sker i så nära anslutning som möjligt till operationen. I regel kan blodtappning genomföras med en veckas intervall, med en sista enhet som tappas 7 till minimum 3 dagar före operationsdagen. Patienten ska ta järntabletter för att öka möjligheterna att hålla Hb-nivån.		
Hållbarheten av autologa blodenheter är 6 veckor i kylförvaring. Patienttext "Autologblod finns på Blodcentralen" kommer att synas i InterInfo. Vid blodbeställning ska BAS-test (serologiskt förenlighetsprovning) utföras på vanligt sätt. På blodbeställningssedeln anges att autologblod finns. Debitering sker oavsett om blodenheterna används eller ej.		
Remitterande läkare har tagit del av informationen ovan och bedömer att patienten är medicinsk lämpad för autolog blodgivning		
Läkarens namn Sign.: Datum:		