

# Remiss - Referenslabb mikrobiologi

Insändare/svarsmottagare, använd streckkodsetikett		Personnr, namn, använd streckkodsetikett	
Kopia till			
Debiteras, om ej insändare		Labnummer / tappningsnummer / referens	
Provtagningsdatum	Klockslag	Provtagarens sign	Provmaterial / Bakteriestam isolerad från
Insjukningsdatum, diagnos, kliniska data, frågeställning, antibiotikabehandling etc.			
Remitterande läkare, kontaktnr			

## Önskad undersökning:

**C.difficile, typning**

**Moxifloxacinresistent stam**

**Utbrott?**

Vid utbrottsfrågeställning, vilka prover ska jämföras: .....

Kontaktperson: .....

**Neisseria meningitidis, typning och resistensbestämning**

**Neisseria gonorrhoeae, verifiering och resistensbestämning**

**Neisseria gonorrhoeae, verifiering, resistensbestämning och helgenomsekvensering**

**Neisseria gonorrhoeae, konfirmering (PCR/NAAT)**

**Makrolidresistens hos Mykoplasma genitalium**

**Kinolonresistens hos Mycoplasma genitalium** OBS! Endast indicerat vid verifierat behandlingsmisslyckande med Moxifloxacin

**Csv-Bakterie-DNA (16s)**

**Csv-Akut infektion PCR** Multiplex detektion av ett flertal virus och bakterier.

**Multiplex PCR HCV/HBV/HIV**

Helblod, 1 st 6 mL EDTA-rör och 1 st 4 mL EDTA-rör

Blod från avliden, minst 5 mL

**HTLV konfirmation**

Serum/plasma, minst 500 µL, för antikroppskonfirmation

Helblod, 2 \* 6 mL i EDTA-rör, för påvisning med PCR

För biobanksinformation se: <https://biobanksverige.se/>

Se webben för [Provtagningsinformation](#) och [Provtagningsanvisningar](#)

**VO laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi**

Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 ÖREBRO Telefon: 019 - 602 11 85

936138 R2

