



Remiss autolog blodgivning

Remitterande enhet:		Personnr:
Kopia/akutsvar sänds till:		Namn:
<input type="checkbox"/> Öppenvård	<input type="checkbox"/> Inneliggande	Adress:
Remissdatum		Telefon:
Rem läkare:		Patient data:
Namn:		Hb g/L
Adress:		Vikt kg
Remiss till:		Smittscreen utfört (HBV, HCV, HIV, HTLV, Lues) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aferesmottagningen, USÖ	Tel. 019 - 6022639	Jehovas vittne: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<input type="checkbox"/> GeBlod Karlskoga lasarett	Tel. 0586 - 66292	
Indikation för autolog blodgivning		
Inför planerad operation		Infrysning för eget behov (frystblod)
Diagnos/planerat ingrepp:		Sällsynt blodgrupp: _____ - negativ
Operationsdatum:		Multipla erytrocytantikroppar:
Inlägges avdelning:		anti - _____ - _____ - _____ - _____
Önskat antal blodenheter <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> _____		
Järntabletter 100 mg 1 x 2 är ordinerade <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Remitterande läkare har tagit del av informationen nedan och bedömer att patienten är medicinsk lämpad för autolog blodgivning		
Läkarens namn Sign.: Datum:		
Information till remitterande klinik		
<i>Autolog blodgivning (egenblodgivning) kan göras inför planerade operationer.</i>		
<i>Patientens hälsa ska tillåta avtappning av 450 mL blod det önskade antalet gånger utan risk. Blodvolymen är relaterad till kroppsvikten. För patienter med kroppsvikt < 50 kg och/eller yngre än 18 år bör en samlad bedömning göras utifrån Hb, vikt, ålder och antalet planerade autologa enheter (en mindre tappningsvolym än 450 mL kan då bli aktuell).</i>		
<i>Väl ifylld remiss skickas i god tid före planerad operation. Ange antal önskade blodenheter. Autolog blodgivning sker i så nära anslutning som möjligt till operationen. I regel kan blodtappning genomföras med en veckas intervall, med en sista enheten som kan tappas senast 4 dagar före operationsdagen. Patienten ska ta järntabletter för att öka möjligheterna att hålla Hb-nivån.</i>		
<i>Hållbarheten av autologa blodenheter är 6 veckor i kylförvaring. Patienttext "Autologblod finns på Blodcentralen" kommer att synas i Interinfo, Klinisk Portal. Vid blodbeställning ska BAS-test (serologiskt förenlighetsprovning) utföras på vanligt sätt. På blodbeställningssedeln anges att autologblod finns. Debitering sker oavsett om blodenheter används eller ej.</i>		
Kontraindikationer:		
<i>Pågående systemisk bakteriell/viral/svamp infektion, svår hjärt- eller lungsjukdom (t.ex. ventrikulär arytm, aortastenosis, instabil angina, hjärtsvikt), blödarsjukdom, smittsam virussjukdom (positiv HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, anti-HTLV I/II eller lues), hypertoni (> 180/100), hypotoni, aktiv epilepsi, ålder < 16 år, Hb < 110 g/L.</i>		