

## Patientinformation - Glukosbelastning

**Besöket avser:** Glukosbelastning som beräknas ta cirka 2 ½ timme.

**Viktigt att tänka på:** Om du har genomgått en Gastric Bypass-operation ska glukosbelastning inte utföras. Kontakta din vårdgivare.

Du kommer vid besöket att få dricka en sockerlösning som innehåller E211 och E330, om du är överkänslig mot dessa, kontakta oss i god tid innan ditt besök.

Under tre dygn före belastningen ska du ej haft någon infektion eller utfört någon kraftig kroppsansträngning.

Du ska vara fastande och ej röka eller snusa från kl 22.00 kvällen före belastningen.

Du får inta ev morgonmediciner med ett litet glas vatten, dock ej kortisontabletter om du behandlas med dem.

**Information: Glukosbelastningen går till på följande sätt:**

Blodprov tas venöst för att bestämma fasteblodsocker.

Du får därefter dricka en sockerlösning. Ett nytt blodprov tas venöst efter 2 timmar. (Är du gravid tas blodprov både efter 60 minuter och efter 2 timmar).

För att få ett rättvisande resultat av belastningen måste du sitta stilla på mottagningen under hela besöket, endast toalettbesök är tillåtna. Detta innebär att barn inte kan närvara vid besöket.

**Ta med:** Godkänd legitimation, kallelse.

**Vid kontakt:** Telefonnummer: .....

**Avboka tid:** Meddela oss snarast om du inte kan komma på den bokade tiden. Uteblivet besök eller avbokning mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med en avgift.

**Med vänlig hälsning**

.....