


Vägledning för rött spår – gäller ej barn.

Patient med behov av omfattande nya eller förändrade sjukvårds- och/eller rehabiliteringsinsatser ska planeras enligt rött spår. Bilaga handlingsplan rött spår i Lifecare SP ska fyllas i. Ta ställning till om insatsen kräver utbildning av kommunens personal.

I varje enskilt fall ska den kommunala och regionala primärvården göra en bedömning om det finns förutsättningar för att insatsen ska kunna utföras i hemmet eller det särskilda boendet. Bedömningen kan vid behov ske med stöd av den fasta läkarkontakten på vårdcentralen alternativt slutenvårdsläkaren om det medicinska ansvaret ligger kvar inom slutenvården.



Utbildning

Slutenvården kan erbjuda utbildning i vissa arbetsmoment på den aktuella vårdavdelningen eller på kliniskt träningscenter (KTC) utifrån avdelningschefens bedömning. [Se Vägledning utbildning av vårdpersonal](#)

Exempel som kan vara aktuella för planering enligt rött spår:

Exempel på insatser inom somatisk vård

- Rehabiliteringsbehov ex. stora restriktioner
- PICC-line
- Subcutan venport
- Sugning av övre luftvägar
- Trakealvård
- Injektions-/Infusionspump
- Hemventilator/inhalator
- Hostmaskin
- Nackkrage/halskrage
- Central venkateter
- Nutritionssond via näsa
- Blodtransfusion
- Långtidsinfusion som kräver övervakning
- Järninjektion
- Intravenös antibiotikabehandling

Ovanstående insatser kan planeras enligt gult spår om parterna är överens.

Exempel inom psykiatrisk vård:

- Förstagångsinsjuknande i svårare psykiatriska tillstånd där patienten direkt hamnar inom den psykiatriska heldygnsvården.
- En del svårare tillstånd (Schizofreni och bipolära patienter) som är färdigbehandlad på avdelningen men ändå har en flora av "resttillstånd", kvarvarande symtom och kognitiva funktionshinder. Kommunens personal kan i sådana fall behöva info om bemötande, handlingsplan då patienten uppvisar tidiga tecken o.s.v. Även för vissa patienter med självskadebeteende kan vara lämpligt att genomföra SIP innan utskrivning.
- Patienter som har en psykisk sjukdom med samtidig somatisk ohälsa som kräver omfattande insatser.
- Patienter som är bostadslösa med svår psykiatrisk problematik.

Vid rött spår görs alltid en individuell bedömning utifrån patientens önskemål och behov.