

Rapport vid transfusionskomplikation

Vårdadress

Patientidentitet

Bedömning av reaktionens svårighetsgrad

Lätt Måttlig Svår

Transfusion

Erythrocyter Annan :
 Trombocyter
 Plasma

Aktuella symptom

Urtikaria Blodtrycksstegring
 Anafylaktisk chock Tryck över bröstet
 Quincke ödem Diarré
 Illamående/kräkning Ikterus
 Blodtrycksfall Frossa
 Arytmi Generell rodnad
 Kramper Astma
 Hemoglobinuri Cyanos
 Enstaka utslag Pulsstegring
 Petchier Yrsel
 Dispné Lumbal smärta

Tempstegring °C
började kl duration

Övrigt ¹

Tidigare haft transfusionskomplikation

Datum

I form av

Tappningsnummer ²	Komponentkod

Förlopp

Transfusion påbörjades
den kl och avbröts kl
då hela enheten/ca mL givits.

Transfusionskomplikationen observerades
den kl

Blodprov för utredning tagna ³ Ja Nej

Rapportör

Datum

Upplysningar 1-4 finns på nästa sida >>

Blodcentralens anteckningar

Rapport mottagen den kl

Antal mottagna enheter

Inspektion ua med anmärkning

Registrering av transf m reaktion i ProSang Ja

Kontaktad läkare

Utredning utförs Nej Ja

Labnr

Prov före transfusion finns saknas

Prov efter transfusion erhållet ej erhållet

Tid reaktion (G000) Nej Ja

Kvinnlig givare ingår Nej Ja

Bakterieodling Nej Ja

IgA-bristutredning Nej Ja

Leukocytantikroppsutredning Nej Ja

Tillåt BAS-test Nej Ja

Telefonsvar Preliminärt svar Slutsvär

BMA sign

Läkarsignatur datum

Rapport till BIS Ja datum

UPPLYSNINGAR

1. Vid "övrigt" kan andra förekommande symptom anges, samt diagnos och medicinering.
2. Skriv påsens/påsarnas tappningsnummer och komponentkod. Ang även andra pågående/precis avslutade infusioner.
3. Vid **lätta** snabbt övergående reaktioner är provtagning **ej** nödvändig, men rapportering på denna blankett skall ändå ske till Blodcentralen.

Vid **måttlig** och **svår** reaktion skall 2 st 7 mL rör utan tillsats och 2 st 3 mL EDTA-rör tas.

Med prov skall följa "Remiss, Blodgruppsserologiska undersökningar". Patientidentitet skall vara intygad.

Lämna dessa prov och ifylld rapportblankett till Blodcentralen.

Lämna även påsen/påsarna, väl försluten i separat plastpåse samt tillhörande följesedel.

Med ledning av uppgifter om patientens symptom, vid inträffad transfusionskomplikation, avgör blodcentralens läkare, vilka åtgärder som skall vidtagas med de inlämnade proven.

Vid misstanke om transfusionskomplikation till följd av **bakteriellt kontaminerad** komponent, måste blodpåsen snarast lämnas till Blodcentralen. Odling på komponenten ombesörjes av Blodcentralen. Odling på patientens blod (blododling) ombesörjes av vårdavdelningen/mottagningen.

Kontakta Blodcentralen om något är oklart!.