

Indikation för ambulanstransport

Transport beställd	Avser datum	Av
--------------------	-------------	----

- Läkemedelsadministration
- Medicinsk övervakning
- Utförande av eller beredskap för utförande av medicinsk behandling

Personuppgifter

ID styrkt Ja Nej

Avsändande enhet

Klinik och avdelning

Telefon

Patientansvarig läkare

Mottagande enhet

Klinik och avdelning

Telefon

Patientansvarig läkare

Aktuellt sjukdomstillstånd

Medicinsk övervakning och behandling

Markera övervakningsintervall i minuter

	5	15	30		5	15	30
AF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bltr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puls	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpO ₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RLS/GCS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EKG 3 AVL 12 AVL

O₂

Övrigt

Känd smittsam sjukdom, om ja, vilken?

Ja Nej

Tillfällig läkemedelsordination	Volym mg/ml	Signatur

Vitalparametrar vid beställning			
AF		RLS/GCS	
Puls		Temp	
Bltr		NEWS2	
SpO ₂			

Beslut om behandlingsinskränkning under transport

Ja Nej Vilka?

Övrig information, medföljande personal, annat

Vid förändring i patientens tillstånd kommer ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer att tillämpas om andra ordinationer saknas



Bakgrund och bilaga till ambulanssjukvårdens transportordination

Det förekommer allt fler fall där ambulans larmas ut, trots att den vårdsökande skulle kunna ta sig till vårdinrättning på annat sätt. Detta utan att det skulle medföra någon ökad medicinsk risk eller påtaglig försämrad omvårdnad. Den ökande nyttjandegraden av ambulanssjukvården får till följd att risk för situationer med resursbrist uppstår, det vill säga, att ambulans inte finns tillgänglig vid akuta behov.

- I Region Örebro län (RÖL) finns sedan flera år beställarkriterier som definierar vid vilka tillstånd ambulanstransport skall beställas mellan vårdinrättningar. Dessa grundar sig på nedanstående kriterier (fet text), där ambulanstransport är avsedd för patienter som kräver sjukvårdsinsats under färden. En medicinsk indikation ska alltså föreligga. I princip innebär detta att behov av nedanstående åtgärder under färden föreligger:
 - 1. Läkemedelsadministration, exempelvis: oxygen, infusionsbehandling, smärtbehandling**
 - 2. Medicinsk övervakning, exempelvis: andningsfrekvens, pulsoximetri, puls och blodtryck, medvetandegrad och EKG**
 - 3. Utförande av eller beredskap för medicinsk behandling/omvårdnad i händelse av försämring, exempelvis: kontrollerad ventilation, säkrande av luftväg, hjärt- och lungräddning, immobilisering av olika slag**
 - 4. Uppfylls inte kraven ovan skall transporten ske på annat sätt, exempelvis med taxi eller liggande sjuktransport. Detta innebär alltså att ekonomiska eller sociala förutsättningar, förlängd väntetid på annat transportsätt och liknande, inte utgör grund för transport med ambulans.**
- Behovskraven ovan gäller egentligen oavsett om transporten beställs av vårdenhet (sekundäruppdrag) eller privatperson (primäruppdrag), skillnaden är endast att allmänheten har svårare att göra denna behovsbedömning.
- Ambulanssjukvården använder sig av samma triageverktyg avseende prioritet, behov av vård och omvårdnad, som länets akutmottagningar, RETTS™ (Rapid Emergency Triage and Treatment System). Detta verktyg ger en vägledning i hur snabbt den vårdsökande är i behov av en läkarbedömning, samt vilka åtgärder som ska vidtas tills läkarbedömning sker.
 - Prio RÖD/ORANGE omgående,
 - Prio GUL inom 1-2 timmar,
 - Prio GRÖN kan vänta >2 timmar.
- Idag bemannas alla ambulanser av minst en legitimerad sjuksköterska. Majoriteten av sjuksköterskorna är dessutom specialistutbildade inom prehospitäl sjukvård.
- Utifrån direktiv från medicinskt ledningsansvariga läkare inom ambulanssjukvården i Region Örebro län, och grundat på en professionell undersökning av patienten, bedöms leg. sjuksköterska *ha kompetens att bedöma vilken vårdnivå samt ev transportsätt till vårdinrättning, som den vårdsökande har behov av*. Denna riktlinje utgår från att patienten vill ha vård. I de fall patient avsäger sig vård/"vägrar vård" gäller annan specifik riktlinje.

Primärvårdspatient enligt länsöverenskommelse i Region Örebro län

Ortopedi

- Patienter med lindriga till måttliga smärtor från rörelseapparaten med eller utan trauma, och utan svår rörelse- eller belastningssmärta, dvs ingen uppenbar frakturmisstanke.
- Lindrig ryggsmärta utan neurologisk störning eller vattenkastningsbesvär
- Sen- och slemhäcksinflammationer
- Patienter med lindriga skador på tår och fingrar, med lätt smärta, svullnad eller hematom.

Kirurgi

- Lindriga buksmärter utan allmänsymtom, förstoppning
- Symtom som: sura uppstötningar, sveda, sugningar i övre delen av buken.
- Okomplicerade sårskador
- Okomplicerad urinstämma
- Lättare trauma
- Måttliga anorektala besvär med smärta eller lindrig blödning

Gynekologi

- Miktionsbesvär/sveda
- Lindriga lågt sittande buksmärter och/eller flytning utan allmänsymtom
- Lätt-måttlig blödning alt. Blödning och lättare värk hos opåverkad patient. Gäller även
- Postpartuminfektion > 4 v

Öron, näsa och hals

- Näsblödningar utan allmänpåverkan
- Främmande kropp i näsan
- Misstänkt näsfraktur, öroninfektion, halsinfektion

Internmedicin / infektion

- Rörelsekorrelerad bröstsmärta utan andningsbesvär
- Lättare allergiska reaktioner, även urticaria, utan allmänpåverkan. Eksem/utslag
- Lång anamnes på bröstsmärta utan misstanke på cardiell genes

- Hjärtrytmrubbning utan allmän påverkan
- Andnöd/andfåddhet, lindrig
- Astma/kol, lindrig
- Hosta utan blodig upphostning eller allmänpåverkan
- Svimning, utan allmänpåverkan samt vid ortostatiska besvär
- Diabetesproblem utan allmänpåverkan
- Yrsel, lindrig
- Huvudvärk utan plötsligt insjuknande, allmänpåverkan, feber, eller neurologiska symptom
- Feber utan allmänpåverkan.
- Akuta ledbesvär
- Lindrig abstinens
- Försämrad hälsa, utan akut nytillkomna somatiska besvär, som ger en sviktande hemsituation.

Barn & ungdom

- Lättare allergiska reaktioner, även urticaria, utan allmänpåverkan. Eksem/utslag
- Lindriga buksmärter utan allmänpåverkan
- Förstoppning
- Tillfällig tarmlödning 1-2 ggr.
- Övre luftvägsbesvär och/eller öronsymptom. Halsont
- Feber utan allmänpåverkan hos barn > 6 månader
- Hosta/obstruktivitet med eller utan feber, utan påtaglig allmänpåverkan eller andnöd
- Kräkningar/diarré utan påtaglig allmänpåverkan hos barn som kan dricka vätska
- Hälta utan trauma
- Huvudvärk utan allmänpåverkan
- Smärtor och trängningar till vattenkastning hos barn > 3år