

اطلاعات در مورد توبرکلوز نهفته

توبرکلوز چیست؟

توبرکلوز یک بیماری عفونی است که توسط باکتری ایجاد می شود و پیش از همه به شش ها حمله می کند اما ممکن است سایر اعضای بدن را نیز تحت تاثیر قرار بدهد.

توبرکلوز چگونه پخش می شود؟

وقتی که فرد مبتلا به توبرکلوز ریوی سرفه می کند باکتری توسط هوا پخش می شود و افراد در محیط نزدیک ممکن است آن را تنفس کنند. همه از جمله کسانی که در معرض آلوده شدن به میکروب قرار می گیرند، مبتلای عفونت نمی شوند.

توبرکلوز نهفته چیست؟

اکثریت از جمله کسانی که آلوده به عفونت می شوند دچار بیماری نمی شوند. قوه دفاعی بدن ممکن است از افزایش باکتری جلوگیری کند. باکتری در بدن باقی می ماند اما فعال نمی باشد بلکه در حالت خفگی قرار داشته می باشد. این را توبرکلوز نهفته می گویند.

افراد آلوده به توبرکلوز نهفته

- تندرست هستند
- توبرکلوز را به دیگران انتقال نمی دهند
- معاینه PPD (معاینه جلدی) یا IGRA (معاینه خون) شان مثبت می باشد

آیا ممکن است توبرکلوز نهفته فعال گردیده منجر به بیماری شود؟

بله، ولی این خلاف معمول است. توبرکلوز نهفته در ۹ از جمله ۱۰ نفر آلوده هیچ گاه به مریضی فعال پیشرفت نمی کند. البته خطر فعال شدن عفونت توبرکلوز نسبتاً گسترده تر برای افراد قرار ذیل است

- افراد تازه آلوده شده، طی دو سال نخستین بعد از آلوده شدن
- کودکان کم سن
- بعد از حاملگی
- کسانی که مبتلای امراض دیگر هستند یا ادویه مصرف می کنند که این احتمال دارد میکائیزم دفاعی بدن را تحت تاثیر قرار بدهد

علامت توبرکلوز

- سرفه طولانی طی بیشتر از ۳ هفته
- تب
- عرق هنگام شب
- کاهش ناخواسته وزن
- تورم غدد لنفاوی

در اثنای بروز یکی از علائم مذکوره فوق می توان به منظور از میان بردن امکان توبرکلوز فعال به دکتور مراجعه کرد.

آیا توبرکلوز نهفته قابل تداوی است؟

توبرکلوز نهفته در بعضی شرایط تحت تداوی قرار می گیرد تا از خطر پیشرفت عفونت به توبرکلوز فعال در آینده جلوگیری صورت گیرد. افراد تازه آلوده شده یا افراد در معرض خطر مبتلا شدن به توبرکلوز فعال از دلایل دیگر، ممکن است تحت تداوی قرار بگیرند.