



Agahî werema (tuberkuloz) veşartî

Werem çîye?

Werem enfeksîyoneke baqterîya ye kû bi piranî zera dide pişikan, lê karê zera bide organên din jî.

Werem çawa belav dibe?

Dema ku kesekî weremî di kuxe baqterî bi hewayê belav dibin, insanên din ku nêzîkî vî kesîne mumkine ku van baqterîyan bi nefesê bikşînin. Lê ne hemmu kesên ku van baqterîya dikşînin xwe bi enfeksiyon dibin.

Werema veşartî çîye?

Gelek kesên enfeksiyon girtî nexweş nakevin. Hêzên parastina laşê yekî zêdebûna baqterîya karê bisekinîne. Baqterî di laşê yekî de dimînin, lê ne aqtîvin di îstrahedêdene. Jêre tê gotin werema veşartî.

Kesekî bi werema veşartî

- tendurist e
- nikarî weremê belavî kesên din bikî
- pêre PPD (testa cild) yan jî IGRA (testa xwînê) ya pozîtîf heye

Ma yek karê bi aktîvkirina werema veşartî bike kû nexweşîya aktîv derkevê holê?

Belê, lê kêman. Neh ji deh kesên bi werema veşartî hiç nabine bi nexweşîya aktîv. Rîska ku enfeksiyona weremê aktîv bibe bêhtire

- ji kesên ku nû têgerandî, herdu salên piştî fersenda têgerandinê
- ji bo zarokên piçûk
- piştî bihamilbûnekî
- heger nexweşîne din li cem yekî hebin yan jî xwarina dermanan kû tesîrî demîngirtinê dikin

Semptomên werema aktîv çine?

- Kûxika ji 3 hefteya bêhtir
- Germahî
- Xwedana bişev
- Zeîfbûna bêdil
- Werimandina toşpîyên lenfa

Dema ku ev semptom werin dîtî têkilî bi doktorre deyne ji bo ku werema aktîv heye an nîne werê zanîn.

Ma werema veşartî karê werê tedawîkirin?

Carna ji bo werema veşartî tedawî tê dayin ji bo kêmkirina rîska ku enfeksiyon piştê bi guherê werema aktîv. Kesên nû têgerandî yan jî ji sedemên din ku rîsk bilinde ku werema aktîv bistînin karin werin tedawîkirin.