

# Antiviral behandling mot influensa

## Lindrar symtom och förebygger sjukdom

### Behandling vid influensasyntom

Bör övervägas till

- person i riskgrupp för svår influensa
- person som behöver sjukhusvård på grund av svår influensa

*Rekommendation gäller oavsett vaccinationsstatus*

### Profylaxbehandling efter exposition

Bör övervägas till

- Person i riskgrupp för svår influensa, som varit i nära kontakt med influensasjuk person, till exempel på särskilt boende eller vårdavdelning.



## Tidig behandling ger bäst effekt


Antiviral behandling bör påbörjas redan vid misstanke om influensa, helst inom 48 timmar från symtomdebut. Men till personer med allvarlig sjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar, kan behandling påbörjas senare.

## Antiviral behandling hindrar virusreplikation

Det finns två typer av antivirala läkemedelssubstanser som kan användas vid influensa:

- Oseltamivir (kapslar)
- Zanamivir (inhalator)

De tillhör gruppen neuraminidashämmare. För intravenös behandling finns licenspreparat. [Läs mer på lakemedelsverket.se](http://lakemedelsverket.se)



När neuraminidashämmare fäster på influensavirus, hindras virus från att föröka sig och sprida sig vidare i kroppen.



Oseltamivir



Zanamivir