

Praktiska förberedelser provokation i öppenvård

Det antibiotika som gett reaktion ges i vanlig terapeutisk dos, som engångsdos. Det kan vara bra att ha ett litet paket av tabletter plus mixtur av Kåvepenin, Flukloxacillin, Amoxicillin i förrådet. Om annat antibiotika gett reaktion kan man beställa hem detta innan provokationen. Patienten observeras under 1 timme i väntrummet. Kan ges i fritt intervall eller i samband med uppstart av infektionsbehandling.

Förberedelser:

- Säkra att aktuell antibiotika finns i läkemedelsförrådet.
- Patienten ska få information om att inte ta antihistamin 72 h innan respektive betablockad 24 h innan planerad provokation.
- Informera bistående personal (t.ex uska/ssk) om planerad provokation.
- Uppmana patienten att säga till vid symtom.
- Vid lindriga allergiska symtom (enstaka nässelutslag, lindrig klåda i mun/näsa/ögon) tas vitalparametrar: allmäntillstånd, saturation, puls, blodtryck. Om normalt. Fortsätt observera pt.
- Vid svåra allergiska symtom (snabbt uppkommen generell urtikaria, andningsbesvär och/eller blodtrycksfall: ge akutbehandling.
- Akutbehandling vuxna: Adrenalin 0,3 mg i.m. Kortison: T Betapred 0,5 mg 10 st Antihistamin: T Desloratadin 5 mg 1-2 st vid klåda Vid andningsbesvär: Ventoline i inhalationsspray och spacer 6-12 puffar eller nebulisator 5-10 mg
- Det är MYCKET ovanligt med allvarlig reaktion om provokationen getts på rätt indikation (se dokument **Utredning av antibiotikaallergi**).

Efteråt:

- Be pt att höra av sig om reaktion uppkommer inom 3 dygn alternativt boka telefontid efter 3 dagar.
- Ta bort uppmärksamhetssymbol om provokationen gått bra.