

## Antidotlista lasarettet Karlskoga

Nedanstående antidoter lagerhålls i antidotskåp på Intensivvårdsavdelningen för behandling vid inträffade förgiftningar (avvikande förvaringsplats anges i listan).

Kontakta giftinformationscentralen vid minsta tveksamhet (tfn [010-456 67 19](tel:010-4566719))

Information om akuta förgiftningar och lista över rekommenderade antidoter finns på: [www.giftinformation.se/lakare/](http://www.giftinformation.se/lakare/) och <https://giftinformation.se/lakare/aktuellt/forgiftningar---behandlingsanvisningar-och-antidotlista/behandlingsanvisningar-och-antidotlista/>

September 2021, Granskad och godkänd av:

Johnny Heikkilä, Anestesi/IVA-kliniken Lindesberg \_\_\_\_\_

Uppdaterad av: Åke Malm, ApoEx Örebro \_\_\_\_\_

PREPARAT	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
<b>Acetylcystein</b> <i>inh vätska 200 mg/ml</i>	4x 10x 10 ml		Paracetamol, vit-, och lömsk flugsvamp och gifthätting
<b>Akineton</b> <i>inj vätska 5 mg/ml</i>	2x 5x 1 ml		Vissa neuroleptika
<b>Anticholium</b> <i>inj vätska 2 mg/ 5 ml</i> (licenspreparat)	2x 5x 5 ml		Antikolinergika
<b>Atropin</b> <i>inj vätska 0,5 mg/ml</i>	20x 20 ml		Karbamater, nervgaser, organiska fosforföreningar, kolinerger förgiftning
<b>Atropin</b> <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	1x 5x10 ml		Förgiftningar med potenta kolinesterashämmare
<b>Calciumfolinat</b> <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	8x 1x10 ml	KYL	Metanolförgiftning och vid överdos av folsyraantagonist
<b>Calciumgluconat</b> <i>inj vätska 10% (10 ml innehåller 2,25 mmol kalcium)</i>	20x 10 ml	IVA BAS	Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra, oxalater
<b>C-gel calciumgluconate gel</b> <i>Gel 2,5 %</i>	1x 40 g		Fluorvätesyra
<b>Calcium-Sandoz</b> <i>Brustabletter 1 g Ca<sup>2+</sup></i>	2x2x10 st		Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra,oxalater
<b>Carbomix</b> <i>granulat till mixtur 50 g</i>	3x 1x 50 g	IVA BAS	Som adsorberande medel (aktivt kol)
<b>Carnitene inj.</b> <i>vätska 200 mg/ml</i>	1x5x5 ml	Akuten USÖ	Överdoserings av valproat
<b>Cyanokit</b> <i>inf substans 2,5 g</i>	2x 1x5 g		Brandrök, cyanidföreningar
<b>Dantrium</b> <i>inj substans 20 mg</i>	1x12x20 mg	ANESTESIN	Malign hypertermi, malignt neuroleptiskt syndrom och serotoninergt syndrom
<b>Desferal</b> <i>inj och inf substans 500 mg</i>	1x 10x 500 mg		Järn

## Antidotlista lasarettet Karlskoga

PREPARAT	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	ANVÄNDNINGSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
<b>Digifab TM</b> <i>inj substans 40 mg(licens)</i>	4x 1x 40 mg	KYL	Digitalis förgiftning (Lager USÖ 12x1x40mg)
<b>Flumazenil</b> <i>inj vätska 0,1 mg/ml</i>	3x5x 5 ml		Bensodiazepiner, bensodiazepinderivat
<b>Fomepizol</b> <i>Konc. till inj 5 mg/ml</i>	2x5x20 ml		Etylenglykol, metanol
<b>Glaubersalt</b> <i>pulver 75 g</i>	1x 75 g		Bariumföreningar som laxermedel
<b>Glucagon</b> <i>inj substans 1 mg</i>	3x10x1 mg	KYL	Hjärtstimulerande, blodsockerhöjande
<b>Glukos-etanol</b> <i>Inf vätska 50 mg/ml + 100 mg/ml</i>	6x500 ml		Etylenglykol, metanol
<b>Intralipid (sojaolja, raffinerad)</b>	4x250 ml		Förgiftning med lipofila läkemedel, lokalbedövn.
<b>Konaktion Novum</b> <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	5x5x1 ml	IVA BAS	Överdoserings med kumarinpreparat
<b>Kräksirap</b> <i>Oral lösning</i>	1x60 ml		Som kräkmedel
<b>Macrogol 400 APL</b> <i>Kutan vätska</i>	1x300 ml		Fenoler Utvärtes
<b>Macrogol 400 APL</b> <i>Ögonskölj vätska 33%</i>	1x1000 ml		Fenoler Ögonstänk
<b>Methylthioninium chloride</b> <i>inj vätska 5 mg/ml</i>	2x 5x 10 ml		Fenol, kopparföreningar, nitroösa gaser
<b>Miacalcic</b> <i>inj./inf.vätska, lösn. 100 E/ml</i>	2x5x1 ml	KYL	Hyperkalcemi
<b>Naloxon Hameln</b> <i>inj vätska 0,4 mg/ml</i>	1x 10x 1 ml		Analgetika av morfintyp inkl pentazocin
<b>Natriumtiosulfat</b> <i>inj vätska 150 mg/ml</i>	5x 10x10 ml		Brandrök, bromat, cyanidföreningar, klorat
<b>Nitroglycerin</b> <i>konc till inj vätska 5 mg/ml</i>	10x5 ml	IVA bas	Kärlvidgande och blodtryckssänkande se överdosering i Fass.
<b>Octreotide</b> <i>inj vätska, lösn. 50mikrogram/ml</i>	1x5x1ml	KYL	Överdoserings med perorala antidiabetiska sulfonureider
<b>Olanzapin</b> <i>Munsönderfallande tabletter 5 mg</i>	1x28 st		Vid serotonergt Syndrom

## Antidotlista lasarettet Karlskoga

PREPARAT	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
<b>Periactin</b> <i>tablett 4 mg (licens)</i>	1x30 st		Vid serotonergt syndrom
<b>Pravidel</b> <i>tablett 2,5 mg</i>	1x100 st		Malignt neuroleptikasyndrom
<b>Praxbind</b> <i>Inj/inf vätska, lösning 50 mg/ml</i>	1x2x50 ml	KYL	Snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt
<b>Protaminsulfat</b> <i>inj vätska lösn. 1400 antiheparin IE/ml</i>	1x 5x 5 ml		Heparin
<b>Pulmicort Turbuhaler</b> <i>inh 400 mikrogram/dos</i>	1x200 doser		Retande gaser, nitrösa gaser
<b>Pyridoxin</b> <i>tablett 40 mg</i>	1x100 st		Kopparföreningar
<b>Pyridoxinhydroklorid</b> <i>Inj. Vätska 150 mg/ml</i>	5x10x2 ml		Förgiftning med isoniazid och stenmurkla
<b>Resonium</b> <i>pulver 450 g</i>	1x 450 g		Kalium
<b>Regitine</b> (licens) <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	2x 5x1 ml	KYL	Överdoserings med adrenergika
<b>Viperatab</b> (licens) <i>Inf substans 4 ml</i>	2x 2x4 ml	KYL	Vid huggormsbett
<b>Zyprexa</b> <i>Pulver till injektionsvätska</i>	3x 10 mg		Vid serotonergt syndrom