

Antidotlista lasarettet Karlskoga

Nedanstående antidoter lagerhålls i antidotskåp på Intensivvårdsavdelningen för behandling vid inträffade förgiftningar (avvikande förvaringsplats anges i listan).

Kontakta giftinformationscentralen vid minsta tveksamhet (tfn [010-456 67 19](tel:010-4566719))

Information om akuta förgiftningar och lista över rekommenderade antidoter finns på: www.giftinformation.se/lakare/ och <https://giftinformation.se/lakare/aktuellt/forgiftningar---behandlingsanvisningar-och-antidotlista/behandlingsanvisningar-och-antidotlista/>

Februari 2024, Granskad och godkänd av:

Maria Palmetun Ekbäck, Läkemedelscentrum _____

Uppdaterad av: Åke Malm, ApoEx Örebro _____

PREPARAT	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Acetylcystein <i>inh vätska 200 mg/ml</i>	4 x 10 x 10 ml		Paracetamol, vit-, och lömsk flugsvamp och gifthätting
Akineton <i>inj vätska 5 mg/ml</i>	2 x 5 x 1 ml		Vissa neuroleptika
Anticholium <i>inj vätska 2 mg/ 5 ml</i> (licenspreparat)	2 x 5 x 5 ml		Antikolinergika
Atropin <i>inj vätska 0,5 mg/ml</i>	20 x 20 ml		Karbamater, nervgaser, organiska fosforföreningar, kolinerger förgiftning
Atropinsulfat <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	2 x 5 x 10 ml		Förgiftningar med potenta kolinesterashämmare
Calciumfolinat <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	8 x 1 x 10 ml	KYL	Metanolförgiftning och vid överdos av folsyraantagonist
Calciumgluconat <i>inj vätska 10% (10 ml innehåller 2,25 mmol kalcium)</i>	20 x 10 ml	IVA BAS	Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra, oxalater
C-gel calciumgluconate gel <i>Gel 2,5 %</i>	1 x 40 g		Fluorvätesyra
Calcium-Sandoz <i>Brustabletter 500 mg Ca²⁺</i>	2 x 2 x 10 st		Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra, oxalater
Carbomix <i>granulat till mixtur 50 g</i>	3 x 1 x 50 g		Som adsorberande medel (aktivt kol)
Carnitene inj. vätska <i>200 mg/ml</i>	1 x 5 x 5 ml	Akuten USÖ	Överdoserings av valproat
Cyanokit <i>inf substans 2,5 g</i>	2 x 1 x 5 g		Brandrök, cyanidföreningar
Dantrium <i>inj substans 20 mg</i>	3 x 12 x 20 mg		Malign hypertermi, malignt neuroleptiskt syndrom och serotoninergt syndrom
Desferal <i>inj och inf substans 500 mg</i>	1 x 10 x 500 mg		Järn

Antidotlista lasarettet Karlskoga

PREPARAT	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Digifab TM <i>inf substans 40 mg(licens)</i>	4 x 1 x 40 mg	KYL	Digitalis förgiftning (Lager USÖ 12x1x40mg)
Flumazenil <i>inj vätska 0,1 mg/ml</i>	3 x 5 x 5 ml		Bensodiazepiner, bensodiazepinderivat
Fomepizol <i>Konc. till inf 5 mg/ml</i>	2 x 5 x 20 ml		Etylenglykol, metanol
Glucagon <i>Pulver och vätska till inj 1 mg, i förfylld spruta</i>	3 x 1 mg	KYL	Hjärtstimulerande, blodsockerhöjande
Glukos-etanol <i>Inf vätska 50 mg/ml + 100 mg/ml</i>	6 x 500 ml		Etylenglykol, metanol
Hydroxykobalamin <i>Inj. vätska lösning, 1 mg/ml</i>	1 x 5 x 1 ml		Funktionell B12-brist orsakad av lustgas
Intralipid (sojaolja, raffinerad)	4 x 250 ml		Förgiftning med lipofila läkemedel, lokalbedövn.
Konaktion Novum <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	5 x 5 x 1 ml	IVA BAS	Överdoserering med kumarinpreparat
Kräksirap <i>Oral lösning</i>	1 x 60 ml		Som kräkmedel
Lokelma (natrium- zirkonium- cyklosilikat) <i>pulver 450 g</i>	1 x 30 x 10 g		Kalium
Macrogol 400 APL <i>Kutan vätska</i>	1 x 300 ml		Fenoler Utvärtes
Macrogol 400 APL <i>Ögonskölj vätska 33%</i>	1 x 1000 ml		Fenoler Ögonstänk
Magnesiumsulfat APL <i>pulver till oral lösn 100 g</i>	1 x 100 g		Bariumföreningar som laxermedel
Methylthioninium chloride <i>inj vätska 5 mg/ml</i>	2 x 5 x 10 ml		Fenol, kopparföreningar, nitrosa gaser
Miacalcic <i>inj./inf. vätska, lösn. 100 E/ml</i>	2 x 5 x 1 ml	KYL	Hyperkalcemi
Naloxon Hameln <i>inj vätska 0,4 mg/ml</i>	1 x 10 x 1 ml		Analgetika av morfintyp inkl pentazocin
Natriumtiosulfat <i>inf vätska 150 mg/ml</i>	5 x 10 x 10 ml		Brandrök, bromat, cyanidföreningar, klorat
Nitroglycerin <i>konc till inf vätska 5 mg/ml</i>	10 x 5 ml		Kärlvidgande och blodtryckssänkande se överdosering i Fass.
Octreotide <i>inj vätska, lösn. 50mikrogram/ml</i>	1 x 5 x 1ml	KYL	Överdoserering med perorala antidiabetika sulfonureider

Antidotlista lasarettet Karlskoga

PREPARAT	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Olanzapin <i>Munsönderfallande tabletter 5 mg</i>	1 x 28 st		Vid serotonergt Syndrom
Periactin <i>tablett 4 mg (licens)</i>	1 x 30 st		Vid serotonergt syndrom
Pravidel <i>tablett 2,5 mg</i>	1 x 100 st		Malignt neuroleptikasyndrom
Praxbind <i>Inj/inf vätska, lösning 50 mg/ml</i>	1 x 2 x 50 ml	KYL	Snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt
Protaminsulfat <i>inj vätska lösn. 1400 antiheparin IE/ml</i>	1 x 5 x 5 ml		Heparin
Pulmicort Turbuhaler <i>inh 400 mikrogram/dos</i>	1 x 200 doser		Retande gaser, nitrösa gaser
Pyridoxinhydroklorid <i>Inj. Vätska 150 mg/ml</i>	5 x 10 x 2 ml		Förgiftning med isoniazid och stenmurkla
Regitine (licens) <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	2 x 5 x 1 ml	KYL	Överdoserings med adrenergika
Rivastigmin <i>kapslar 3 mg</i>	1 x 112 st		Långdragna antikolinerga symtom
Toxogonin (obidoxim) <i>Inj vätska 250 mg/ml (licenspreparat)</i>	2 x 5 x 1 ml		Förgiftningar med potenta kolinesterashämmare
Viperatab (licens) <i>Inf substans 4 ml</i>	2 x 2 x 4 ml	KYL	Vid huggormsbett
Zyprexa <i>Pulver till injektionsvätska</i>	3 x 10 mg		Vid serotonergt syndrom