

## Antibiotika-doseringsschema Strama Örebro

Dosering: Två doser per dygn på fastande mage	06.00	18.00	
Dosering: Två doser per dygn ej på fastande mage	08.00	20.00	
Dosering: Tre doser per dygn	06.00	14.00	22.00

Ges helst <b>med måltid</b>	Ges på <b>fastande mage</b> 1 timme före eller två timmar efter måltid	Ges <b>oberoende</b> av måltid
<i>Amoxicillin+betalaktamashämmare - Spektramox</i>	<i>Ceftibuten - Isocef</i>	<i>Amimox - Amoxicillin</i>
<i>Cefadroxil - Cefadroxil</i>	<i>Ciprofloxacin - Ciprofloxacin</i>	<i>Azitromycin - Azitromax</i>
		<i>Cefixim</i>
<i>Doxycyklin - Doxyferm</i>	<i>Doxycyklin - Oracea</i>	<i>Flukonazol - Diflucan</i> (svampläkemedel)
<i>Erytromycin - Abboticin</i>	<i>Flukloxacillin - Heracillin</i>	<i>Klaritromyzin - Klacid</i>
<i>Nitrofurantonin - Furadantin</i>	<i>Fusidinsyra - Fucidin</i>	<i>Klindamycin - Dalacin</i>
<i>Pivmecillinam - Selexid</i>	<i>Pc V - Kåvepenin</i>	<i>Levofloxacin - Tavanic</i>
<i>Sulfametoxazol+trimetoprim - Eusaprim, Bactrim</i>		<i>Metronidazol - Flagyl</i>
<i>Trimetoprim - Trimetoprim</i>		<i>Moxifloxacin - Avelox</i>

--	--	--

Preparat som **försämrar** absorptionen av antibiotika.

Dessa typer av antibiotika bör tas minst 2 timmar före respektive preparat.

<b>Kinoloner-</b> <i>Ciprofloxacin,</i> <i>Levofloxacin,</i> <i>Moxifloxacin</i>	Ska ej ges samtidigt som	Antacida, järntabletter, kalciumtabletter, magnesiumtabletter, sukralfat, zinktabletter
<b>Tetracykliner-</b> <i>Doxycyklin</i>	Ska ej ges samtidigt som	Antacida, järntabletter, kalciumtabletter