

Konverteringstabell för opioider

Observera vid opioidrotation att dosen av den nya opioiden bör reduceras med 25-50 % av ekvivalenstdos.

Tramadol	Morfín eller Ketobemidon				Oxikodon				Buprenorfin	Fentanyl
Dygnsdos mg	Dygnsdos mg	Extrados mg	Dygnsdos mg	Extrados mg	Dygnsdos mg	Extrados mg	Dygnsdos mg	Extrados mg	Dygnsdos mikrog/tim	Dygnsdos mikrog/tim
po	po	po	sc/iv	sc/iv	po	po	sc/iv	sc/iv	transdermalt	transdermalt
50	10	-	3,5–5	-	5	-	3,5	-	5	-
100	20	2,5–5*	7–10	1–2	10	1–2*	7	1	10	12
150	30	5	10–15	2–2,5	15	2,5*	10	2	15	12
200	40	5–10	15–20	3	20	2–5	15	2,5	20	12
300	60	10	20–30	3–5	30	5	20	3	30	25
400	80	10–15	30–40	5–7	40	5–10	30	5	40	25
	100	15–20	35–50	6–8	50	5–10	35	6		37
	120	20	45–60	7–10	60	10	45	7		50
	160	25–30	60–80	10–15	80	10–15	60	10		50
	220	35–40	80–110	15–20	110	20	80	10–15		75
	320	50–55	120–160	20–25	160	25	120	20		100

* Vid peroral extrados under 5 mg kan oral lösning användas.

Tänk på:

- En vanlig vid behovsdos är 1/6 av dygnsdosen.
- Varje patient skall dositeras individuellt.
- Försiktig konvertering vid högre doser.