

Rökstopp och levnadsvanor

Metformin	Metformin	Metformin			Metformin
Fetma	Manifest kardiovaskulär sjukdom	Hjärtsvikt	Nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min)*	Mest sjuka äldre	Övriga Behandling individualiseras
GLP-1-RA** Dulaglutid (Trulicity) Liraglutid (Victoza) Semaglutid (Ozempic) HbA1c-sänkning 10–15 mmol/mol Viktnedgång 3–4 kg Låg hypoglykemisk risk Gastrointestinala bieffekter	SGLT-2-hämmare Dapagliflozin (Forxiga) Empagliflozin (Jardiance) HbA1c-sänkning 7–10 mmol/mol Viktnedgång 2–3 kg Låg hypoglykemisk risk Risk för urogenital infektion, ketoacidosis GLP-1-RA** Dulaglutid (Trulicity) Liraglutid (Victoza) Semaglutid (Ozempic) HbA1c-sänkning 10–15 mmol/mol Viktnedgång 3–4 kg Låg hypoglykemisk risk Gastrointestinala bieffekter	SGLT-2-hämmare Dapagliflozin (Forxiga) Empagliflozin (Jardiance) HbA1c-sänkning 7–10 mmol/mol Viktnedgång 2–3 kg Låg hypoglykemisk risk Risk för urogenital infektion, ketoacidosis	DPP-4-hämmare** Linagliptin (Trajenta) HbA1c-sänkning 6–8 mmol/mol Viktneutralt Låg hypoglykemisk risk Meglitinid Repaglinid (Repaglinid) lakttag försiktighet, starta med låg dos (0,5 mg) till måltiderna (1-3 ggr/dag) och vid behov trappa upp dosen försiktigt Risk för hypoglykemi och viktuppgång. Insulin Insulin human (Insuman Basal) Risk för hypoglykemi och viktuppgång.	DPP-4-hämmare** Linagliptin (Trajenta) HbA1c-sänkning 6–8 mmol/mol Viktneutralt Låg hypoglykemisk risk Insulin Insulin human (Insuman Basal) Risk för hypoglykemi och viktuppgång.	DPP-4-hämmare** Behov måttlig effekt, viktneutralitet, ej hypoglykemi GLP-1-RA** Behov uttalad effekt, vikt-nedgång, ej hypoglykemi Insulin NPH Behov upptitreringsbar effekt Risk hypoglykemi, viktuppgång Meglitinid (Repaglinid) Kan ges vid låg risk för hypoglykemi Viktuppgång SGLT-2-hämmare Behov måttlig effekt, vikt-nedgång, ej hypoglykemi SU (Glimepirid) Kan ges vid låg risk för hypoglykemi Viktuppgång Tiazolidindioner (Pioglitazon) Vid uttalad insulinresistens

* Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 4:2017, tabell VII.

** Både GLP-1-RA och DPP-4-hämmare är inkretinläkemedel och ska ej kombineras.

*** Alla snabbverkande insuliner är likvärdiga och av kostnadsskäl väljs det billigaste alternativet vid nyinsättning och receptförnyelse.

Insulin

Basinsulin
Snabbverkande insulin

Insuman Basal
Insulin aspart Sanofi*** (biosimilär till NovoRapid)