

Information till dig som medicinerar med SGLT2-hämmare

(Forxiga, Jardiance)

Ketoacidosis - en ovanlig men allvarlig biverkan

Behandling med SGLT2-hämmare kan i sällsynta fall leda till att kroppsfett bryts ned till vissa sura ämnen som kallas ketonkroppar. När dessa ansamlas i kroppen kan det leda till så kallad ketoacidosis, som är ett akut medicinskt tillstånd.

Symtom på ketoacidosis

- Ökad och kraftig törst
- Sötaktig/acetondoftande andedräkt
- Onormal trötthet, förvirring
- Snabb och djup andning
- Illamående, kräkningar, ont i magen
- Snabb viktnedgång

När ökar risken för ketoacidosis vid behandling med SGLT2-hämmare?

- Vid minskat intag av kolhydrater som vid fasta eller diet med lågt kolhydratinnehåll, till exempel LCHF-kost (lågkolhydrat-/högfettkost).
- Vid vätskebrist och intorkning till följd av till exempel feber eller sjukdom med diarréer och/eller kräkningar.
- Akuta sjukdomstillstånd som kräver sjukhusvård.
- Stort intag av alkoholhaltiga drycker.
- Svår leversjukdom.

När bör du göra tillfälligt uppehåll i din medicinering med SGLT2-hämmare?

- När du planerar att fasta alternativt ändra till en diet med lågt kolhydratinnehåll
- När du insjuknat med feber, illamående, kräkningar eller diarré
- Vid värmebölja och du samtidigt har svårt att dricka tillräckligt med vätska
- Inför planerad operation i samråd med din läkare

När ska du kontakta sjukvården?

- I första hand skall du göra uppehåll med läkemedlet i ovan nämnda situationer. Om du känner dig akut sjuk ska du kontakta sjukvården. Informera då att du medicinerar med SGLT2-hämmare.

20240412