

Information till dig som ska byta från apixaban/Eliquis till dabigatran/Pradaxa vid förmaksflimmer

Du behandlas med **apixaban/Eliquis**, ett blodförtunnande läkemedel, för att förebygga blodproppar och stroke.

I Region Örebro län rekommenderas vid nyinsättning numera det helt likvärdiga läkemedlet **dabigatran/Pradaxa**.

Efter individuell medicinsk bedömning av ansvarig läkare kan även byte från apixaban/Eliquis till dabigatran/Pradaxa vara aktuellt. Anledningen till detta är att dabigatran/Pradaxa är mer prisvärt, både för dig som patient och för sjukvården, vilket innebär en mer effektiv användning av våra tillgängliga hälso- och sjukvårdsresurser.

Din läkare rekommenderar att du ska byta från apixaban/Eliquis till dabigatran/Pradaxa.

Vad du behöver göra:

- När din förpackning av apixaban/Eliquis börjar ta slut, kan du hämta ut ditt nya läkemedel dabigatran/Pradaxa.
- Du kan börja med dabigatran/Pradaxa direkt dagen efter att du tagit din sista tablett apixaban/Eliquis.
- Doseringsintervallet är det samma, du tar läkemedlet två gånger om dagen.
- Vårdcentralen kommer att fortsätta kontrollera prover avseende njurfunktion, precis som tidigare.
- Har du några frågor gällande effekt, biverkningar, dosering eller annat kan du kontakta din vårdcentral.

20250910